

Paronychie und Unguis incarnatus

Paronychie – Synonym: „Umlauf“

Infektiöse Paronychie:

Ursächliche Erreger:

Staphylokokken, Streptokokken, Pseudomonasarten (gramnegative Bakterien),
Hefepilze (Candida albicans)

Aussehen: Rötung und Schwellung eines umschriebenen perionychialen Bezirkes.

Therapie: Behandlung durch den Arzt! (Erregerbestimmung notwendig)

Nichtinfektiöse Paronychie:

Ursache: Nebenwirkung meist hochdosierter Therapie mit Retinoiden (Vit A-
Abkömmling) die bei der Behandlung der Psoriasis verwendet werden.

Aussehen: identisch zur infektiösen Paronychie, aber häufig mehrere Glieder
betroffen

Therapie: Absetzen des Retinoids nach ärztlichem Rat

Tipps: Ruhigstellung, „Seifenbäder“, Alkoholumschläge

Unguis incarnatus – eingewachsener Nagel

STADIENEINTEILUNG (Norbert Scholz)

Stadium 1A **Unguis incarnatus** eines Nagelwalls ohne entzündliche Zeichen, keine oder nur geringe Beschwerden

Stadium 1B **Unguis incarnatus** an beiden Nagelwällen, keine oder nur geringe Beschwerden

Stadium 2A **Unguis incarnatus** eines Nagelwalls mit Paronychie und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Stadium 2B **Unguis incarnatus** beider Nagelwälle mit Paronychie und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Stadium 3A **Unguis incarnatus** eines Nagelwalls mit eitriger Paronychie und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Stadium 3B **Unguis incarnatus** beider Nagelwälle (medial und lateral) mit Paronychie und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Stadium 4A **Unguis incarnatus** eines Nagelwalls mit Hypergranulation (caro luxurians) und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Stadium 4B **Unguis incarnatus** beider Nagelwälle mit Hypergranulation (caro luxurians) und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Stadium 5A **Unguis incarnatus** nach OP mit Rezidiv und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Stadium 5B **Unguis incarnatus** nach OP mit Rezidiv und Restsporn nach kompletter Entfernung der Nagelmatrix und ausgeprägter Beschwerdesymptomatik

Ursachen: chronische Drucktraumen (inadäquates Schuhwerk), falscher Nagelschnitt, orthopädische Fehlstellungen, Nagelfehlstellung (ung. convolutus)

Therapie: Behandlung der Ursache, Spanentfernung, Druckentlastung(Tamponade), Orthonyxie, Emmert-Plastik